

I) Calculer

$$A = (17,73 + 12,7 + 2,27 + 4/2 \times 2 + 7,3) / 11$$

$$A = (17,73 + 2,27 + 12,7 + 7,3 + 2 \times 2) / 11$$

$$A = (20 + 20 + 4) / 11$$

$$A = 44 / 11$$

$$\boxed{A = 4} \text{ (2)}$$

$$C = 0,17 + (4 \times 2 - 0,6) / 2 + 2 \times 3 + 1,83 + 11,3$$

$$C = 0,17 + 1,83 + (8 - 0,6) / 2 + 6 + 11,3$$

$$C = 2 + 7,4 / 2 + 6 + 11,3$$

$$C = 2 + 3,7 + 11,3 + 6$$

$$C = 2 + 15 + 6$$

$$\boxed{C = 23} \text{ (2)}$$

$$B = 7 + 3 \times 8 \times 1,25 \times 5 / 5 / 6 - 6$$

$$B = 7 + 3 \times 10 \times 5 / 5 / 6 - 6$$

$$B = 7 + 150 / 5 / 6 - 6$$

$$B = 7 + 30 / 6 - 6$$

$$B = 7 + 5 - 6$$

$$B = 12 - 6$$

$$\boxed{B = 6} \text{ (2)}$$

$$D = \frac{3 \times (12 + 2 \times 4 - 10)}{2 + (7 + 2) \times (4 - 2 \times 2)} - \frac{5 \times 9 + 5 \times 11}{\frac{20}{2}}$$

$$D = \frac{3 \times (12 + 8 - 10)}{2 + 9 \times (4 - 4)} - \frac{45 + 55}{10}$$

$$D = \frac{3 \times (20 - 10)}{2 + 9 \times 0} - \frac{100}{10}$$


$$D = \frac{3 \times 10}{2} - 10$$

$$D = \frac{30}{2} - 10$$


$$D = 15 - 10$$

$$\boxed{D = 5} \text{ (2)}$$

II)



III)




IV) Hypothèses

d est la médiatrice de $[AB]$

d coupe $[AB]$ en O (0,5)

$C \in d$

D et C sont symétriques par rapport à O



1) Symétrique de A par rapport à O

Par (H), d est la médiatrice de $[AB]$ et coupe $[AB]$ en O

α la médiatrice d'un segment coupe ce segment en son milieu donc O est le milieu de $[AB]$

donc \boxed{B} est le symétrique de A par rapport à O (2,5)

2) Montrer que : $(AC) \parallel (BD)$

D'après 1) A et B sont symétriques par rapport à O

Par (H) C et D _____

donc (AC) et (BD) _____

or l'image d'une droite par une symétrie centrale est une droite qui lui est parallèle

donc : $\boxed{(AC) \parallel (BD)}$ (2,5)

I) Réécire sans les parenthèses inutiles

$$A = [(16 \times 6) + 5 - 2] - [(5 - 2) \times 8 / (4/2) \times 5]$$

$$A = 16 \times 6 + 5 - 2 - (5 - 2) \times 8 / (4/2) \times 5 \quad (2)$$

$$B = (21 - [10 - (5 \times 2)] - 1) + (3 \times 2 \times 5) - 1$$

$$B = 21 - (10 - 5 \times 2) - 1 + 3 \times 2 \times 5 - 1 \quad (2)$$

$$C = 100 + (10 + 5) - [(27 - 1) + 2] \times (14 \times 3) / (14 \times 7)$$

$$C = 100 + 10 + 5 - (27 - 1 + 2) \times 14 \times 3 / (14 \times 7) \quad (2)$$

$$D = [(1 + 2 - 3 + 4) \times (5 \times 6)] / 7 + [(8/3) \times 10]$$

$$D = (1 + 2 - 3 + 4) \times 5 \times 6 / 7 + 8/3 \times 10 \quad (2)$$

II) Calculer

$$E = 4 \times 7 \times 25 - (1500 / 100 \times 10 + 50)$$

$$E = 4 \times 25 \times 7 - (15 \times 10 + 50)$$

$$E = 100 \times 7 - (150 + 50)$$

$$E = 700 - 200$$

$$E = 500 \quad (2)$$

$$F = 150 / 100 \times 500 / 75 \times [8/2 - (18/3/2) + 1]$$

$$F = 1,5 \times 500 / 75 \times [4 - (6/2) + 1]$$

$$F = 750 / 75 \times [4 - 3 + 1]$$

$$F = 10 \times 2$$

$$F = 20 \quad (2)$$

$$G = 40 \times 8 \times 75 \times 175 / (10 + 10 \times 4 + 200)$$

$$G = 40 \times 25 \times 8 \times 175 / (10 + 40 + 200)$$

$$G = 1000 \times 1000 / 250$$

$$G = 4000 \quad (2)$$

$$H = \frac{3 \times 4 \times 7,5 \times (2 \times 3 - 2 + 1)}{(20 + 18 - 13) \times 2}$$


$$H = \frac{3 \times 10 \times (6 - 2 + 1)}{(38 - 13) \times 2}$$

$$H = \frac{30 \times 5}{25 \times 2}$$


$$H = \frac{150}{50}$$

$$H = 3 \quad (2)$$

III) Construire la symétrique de la figure (4)



IV)



Hypothèses

ABC est un triangle rectangle en B

AB = 3 cm

BC = 5 cm (2)

I est le milieu de [BC]

D est la symétrique de A par rapport à I

1) Montrer que : (AB) // (CD)

Par (H) : I est le milieu de [BC]

donc C est la symétrique de B par rapport à I

• D est la symétrique de A par rapport à I

donc (CD) est symétrique de (BA) par rapport à I

Or la symétrique d'une droite par une symétrie centrale est une droite qui lui est parallèle

donc : $(CD) // (AB)$ (6)

2) Déterminer \widehat{BCD}

1^{ère} méthode : Par (H) :

• I est le milieu de [BC]

donc B est la symétrique de C par rapport à I

et C est la symétrique de B par rapport à I

• D est la symétrique de A par rapport à I

donc \widehat{BCD} est la symétrique de \widehat{CBA} par rapport à I

Or la symétrique d'un angle est un angle de même mesure

donc $\widehat{BCD} = \widehat{CBA}$

Or par (H) le triangle ABC est rectangle en B donc $\widehat{CBA} = 90^\circ$

donc $\widehat{BCD} = 90^\circ$ (5)

2^{ème} méthode

1^{ère} après 1) $(AB) // (CD)$


Par (H) le triangle ABC est rectangle en B donc $(AB) \perp (BC)$

Or si deux droites sont parallèles, tout perpendiculaire

à l'une est perpendiculaire à l'autre

donc $(BC) \perp (CD)$

donc $\widehat{BCD} = 90^\circ$ (5)



- Hypothèses
- O est le milieu de $[AA']$
 - B' est le symétrique de B par rapport à O
 - C est le symétrique de C' par rapport à O (2)
 - d est la médiatrice de $[BC]$

1) Montrer que : $(B'C') \parallel (BC)$



Par (H), B' est le symétrique de B par rapport à O
 Par (H), C est le symétrique de C' par rapport à O
 donc C' est le symétrique de C par rapport à O
 donc $(B'C')$ est symétrique de (BC) par rapport à O
 or le symétrique d'une droite est une droite parallèle
 donc $(B'C') \parallel (BC)$ (4)

2) Montrer que : $d \perp (B'C')$


Par (H) d est la médiatrice de $[BC]$
 or la médiatrice d'un segment coupe ce segment perpendiculairement en son milieu
 donc d est perpendiculaire à (BC)
 de plus, d'après 1) $(BC) \parallel (B'C')$
 or si deux droites sont parallèles, toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre
 donc $d \perp (B'C')$ (6)

3) Comparer les aires de $AB'C'$ et $A'BC'$

Par (H) O est le milieu de $[AA']$
 donc A est le symétrique de A' par rapport à O.
 Par (H) B' est le symétrique de B par rapport à O
 Par (H) C est le symétrique de C' par rapport à O
 donc $AB'C'$ est le symétrique de $A'BC'$ par rapport à O
 or le symétrique d'une figure est une figure de même aire
 donc $AB'C'$ et $A'BC'$ ont la même aire (4)



- 1) O est l'intersection de (AA') et (BB') (4)
- 2) C' est l'un des points d'intersection du cercle de centre A' et de rayon AC avec le cercle de centre B' et de rayon BC (4)



Il y a deux positions possibles pour P notées P_1 et P_2 sur la figure

- 2) Par (H) N appartient à la médiatrice de $[MP]$
 or tout point appartenant à la médiatrice d'un segment est équidistant des extrémités de ce segment.
 donc $NP = NM$
 donc P appartient au cercle de centre N et de rayon MN
 de plus P appartient au parallélogramme ABCD
 donc P est une des intersections du parallélogramme ABCD avec le cercle de centre N et de rayon MN (4)